



ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ!

- Тест обязательно нужно сдать парам, которые решили начать интимную жизнь без предохранения;
- При планировании беременности;
- При обнаружении ВИЧ вовремя начать лечение,



Библиотека № 1, г. Лермонтов,
ул. Октябрьская 42, т.: 3-52-04
e-mail: biblermf1@yandex.ru

Адрес сайта: <http://lerm-cbs.ru/>
Стоп-СПИД: буклет-предупреждение / Муниципальное казенное учреждение города Лермонтова «Централизованная библиотечная система»: Библиотека № 1; сост. Л.А. Еловская.
- Лермонтов, 2024.

Муниципальное казенное учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная
система»
Библиотека № 1

16+

"СТОП-СПИД"

«Прочти и задумайся»



г. Лермонтов,
2024 год

Многие подростки думают, что заражение СПИДом им не угрожает. Многие взрослые, которые сегодня больны, тоже не думали, что СПИД им не угрожает, пока не обнаружили, что заражены. Неизвестно, сколько из них было инфицировано в подростковом возрасте: ведь с момента заражения вирусом и до развития заболевания может пройти 10 и более лет. Многие из этих людей в то время и не знали о СПИДе и не могли предохранить себя от заражения.

В - вирус

И – иммунодефицит:



Ч – человека

ВИЧ поражает защитную систему организма — человек становится **ВИЧ-инфицированным**. Носители ВИЧ могут даже не подозревать, что инфицированы, и передавать вирус другим людям практически сразу с момента инфицирования. Большинство людей - носители ВИЧ, **выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо** в течение продолжительного времени после заражения (иногда до 10 лет). **СПИД** является следствием воздействия ВИЧ на

организм человека. СПИД развивается у людей с ВИЧ, когда иммунная система разрушена. Обнаружить ВИЧ в организме можно **примерно через 3-6 месяцев** после заражения только с помощью специального анализа крови.

С - синдром

П - приобретенного

И – иммунного

Д – дефицита

**ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ТРЕМЯ ПУТЯМИ:**

1. Половым - при любом незащищенном (без презерватива) половом контакте;
2. Через кровь - при использовании нестерильных игл и шприцов при введении наркотиков, нестерильных инструментов для пирсинга и татуажа, при совместном с ВИЧ-инфицированным использовании бритв и бритвенных лезвий;
3. От матери к ребенку - во время беременности, во время родов и при грудном вскармливании,



ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- Через воздух, слезы, слюну, мочу, кашель;
- Через укусы насекомых;
- Через бытовые предметы, посуду, одежду, пищу;

ПРОФИЛАКТИКА:

- Избегать случайных связей;
- Не использовать нестерильные шприцы при внутривенном введении лекарственных средств;
- Не пользоваться чужими средствами личной гигиены;